



ພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ ຊີ Viral Hepatitis C



ມີຄົນອະເມຣິກັນ ຫຼາຍກ່ວາ 4ລ້ານຄົນ ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ ຊີ. ບໍ່ມີ ຢ່າວັກຊີນອັນໃດ ເພື່ອສັກປ້ອງກັນ ພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ c. ຂາວສານອັນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈຕື່ມ ວ່າ ພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ c ແມ່ນຫຼຽງ ແລະທ່ານຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດນີ້ໄດ້ ຄືແນວໃດ. ຈົ່ງອ່ານຂໍ້ຄວາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງ ບາງທີທ່ານອາດຈະຕ້ອງການກວດເລືອດ ເບິ່ງວ່າ ທ່ານ ຈະເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ ຫຼືບໍ່.

ກ້າຫາກທ່ານຕິດເຊື້ອພະຍາດຕັບ ອັກເສບໄວຣັສ c ແລ້ວ, ທ່ານຄວນຮູ້ວ່າ : ພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ c ແມ່ນຫຼຽງ ? (what is Hepatitis C ?) ພະຍາດຕັບ ອັກເສບໄວຣັສ c ແມ່ນພະຍາດຕັບທີ່ເກີດ ອັກເສບ ຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສ C, ເຊິ່ງສາມາດ ກວດພົບຢູ່ໃນເລືອດ ຂອງຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດ ນີ້. ພະຍາດນີ້ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຈາກການ ຈັບບາຍເລືອດຂອງຜູ້ ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ .

ພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ C ນີ້ ຮ້າຍແຮງ ຫຼາຍບໍ່? How serious is hepatitis C? ພະຍາດຕັບທີ່ເກີດອັກເສບຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສ C ແມ່ນພະຍາດມີຮ້າຍແຮງສຳລັບບາຄ ຄົນ, ແຕ່ອາດຈະບໍ່ຮ້າຍແຮງ ສຳລັບບາງ ຄົນ. ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ C ຫຼາຍຄົນຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັສຕິດໂຕ ຢູ່ຕະຫຼອດຊີວິດ. ຄົນຈຳ ພວກນີ້ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມີຕັບຊຸດໂຊມ ແຕ່ວ່າບາງຄົນກໍບໍ່ໄດ້ ມີອາການເຈັບປ່ວຍຍ້ອນພະຍາດນີ້ເລີຍ. ບາງຄົນທີ່ມີ ຕັບຊຸດໂຊມຍ້ອນພະຍາດຕັບ ອັກເສບໄວຣັສ c ອາດຈະມີການຂະຫຍາຍ ໄປເປັນພະຍາດຕັບແຂງ (cirrhosis of the liver) ແລະມີອາການຂອງຕັບເຮັດ ວຽກລົ້ມເຫຼວເຊິ່ງແມ່ນອາການຕັບແຂງ ທີ່ເປັນມາແລ້ວຫຼາຍປີ. ບາງຄົນ ກໍບໍ່ມີອາ ການຈາກພົນສະຫ້ອນທີ່ຍາວນານຄືແນວ ນີ້ເລີຍ. ກ້າຜົນກວດເລືອດ ພົບວ່າ ມີເຊື້ອໄວຣັສຕັບ ຊີ ຂໍອຍຄວນຈະເຮັດແນວໃດ?

What can I do now that my hepatitis C test is positive? ໄປພົບທ່ານໝໍຂອງທ່ານ. ກວດເລືອດຄົ້ນອີກຕື່ມເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈວ່າ ການບໍລິມະຕິພະຍາດບໍ່ຜິດພາດ ແລະ ເພື່ອ ກວດ ເບິ່ງວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ມີອາການຕັບຊຸດໂຊມເທື່ອ.

ກ້າຫານບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບປ່ວຍເດ່ທ່ານຄວນຈະເຮັດແນວໃດ? What if I don't feel sick? ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສຕັບອັກເສບ C ແກ່ຍາວຫຼາຍປີ ຈຳນວນຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ມີອາການເຈັບປ່ວຍ ຫຼຽງເລີຍ ແລະກໍຍັງມີອາການແຂງແຮງດີຢູ່, ແຕ່ກໍຍັງສົມຄວນໄປພົບທ່ານໝໍຂອງຕົນຢູ່. ສຳລັບບາງຄົນອາດຈະພົບວ່າມີອາການເມື່ອຍຫຼາຍເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ.

ຂ້ຽງຄວນຮັກສາຕັບຂອງຂ້ຽງຄືແນວໃດ? (How can I take care of my liver?)

- ໄປພົບທ່ານໝໍຂອງທ່ານຢ່າຄາສະມ່າສະເມີ
- ບໍ່ຄວນດື່ມເຫຼົ້າ
- ໃຫ້ບຸອກທ່ານໝໍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຢາທຸກແນວທີ່ທ່ານພວມກິນ, ແມ້ນແຕ່ຢາທີ່ຊື້ກິນເອງ ແລະຢາຮາກໄມ້ ສະມຸນໄພອື່ນໆ
- ກ້າວ່າທ່ານມີຕັບທີ່ຊຸດໂຊມທ່ານຄວນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ A & B

C ບໍ່ ? (Is there a treatment for hepatitis C?) ມີຢາທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວສຳລັບປິ່ນປົວຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ C ມາເປັນເວລາດົນນານ. ມີປະມານ 3-4 ຄົນ ຂອງຈຳນວນຄົນເຈັບ 10 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ແລະມີອາການຫາຍຂາດຈາກພະຍາດໄວຣັສນີ້ໄດ້. ທ່ານຄວນປຶກສາກ່ຽວກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານເບິ່ງບາງເທື່ອ ການປິ່ນປົວອາດຈະຊ່ອຍທ່ານໄດ້.

ທ່ານສາມາດຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ C ໄດ້ຄືແນວໃດ? How could I have gotten hepatitis C? ເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກ

ເສບ C ແມ່ນຈະແຜ່ລາມໄປສູ່ກັນໄດ້ຈາກການໄດ້ຮັບເລືອດທີ່ຕິດເຊື້ອ ຂອງຄົນໃສ່ຄົນ,

ທ່ານຈະ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ C ໄດ້ ກ້າວ່າ:

- ທ່ານເຄີຍໃຊ້ເຂັມສັກຢາເສບຕິດຮ່ວມກັບໝູ່, ເກິ່ງແມ່ນວ່າທ່ານຈະເຄີຍສັກເປັນບາງເທື່ອ ຫຼາຍປີມາ ແລ້ວກໍຕາມ
 - ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວອາການເລືອດກ້າມອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ (treated for clotting problems) ດ້ວຍພະລິຕະພັນເລືອດທີ່ພະລິດ ແລ້ວກ່ອນປີ 1987
 - ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບການໃສ່ເລືອດ ຫຼື ໄດ້ຮັບການປ່ຽນອະວັຍວະ ຈາກບຸກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບ ມາກ່ອນ (ເຊັ່ນ ປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕັບ, ຫົວໃຈ)
 - ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບການປ່ຽນເລືອດ ຍ້ອນໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ດີ
 - ທ່ານເຄີຍເຮັດວຽກນຳຄືນເຈັບມາກ່ອນ ແລະເຄີຍຈັບບາຍເລືອດຢູ່ບອນເຮັດວຽກ, ໂດຍສະເພາະອາດກຶກເຂັມສັກຢາແທຄໂດຍບັງເອີນ
 - ແມ່ຂອງທ່ານຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບໃນລະຍະຕຽມເກີດທ່ານ
 - ທ່ານເຄີຍມີເພດສຳພັນກັບບຸກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບ C
 - ທ່ານຢູ່ຮ່ວມກັບບຸກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບ C ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຂອງຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນວ່າ ມືດແກໝວດ ຫຼື ພອຍພັດແຂ້ວເຊິ່ງບັງເອີນມີເລືອດຕິດຢູ່
- ຂ້ຽງຈະປ້ອຄກັນການແຜ່ເຊື້ອໄປສູ່ຄົນອື່ນໄດ້ຄືແນວໃດ?
- How can I prevent spreading hepatitis C to others?
- ບໍ່ຄວນບໍລິຈາກເລືອດ, ອະວັຍະວະໃນຮ່າງກາຍ, ແຜ່ນຊິ້ນຂອງຮ່າງກາຍອື່ນໆ, ຫຼື ນ້ຳກາມ
 - ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ ເຊັ່ນ ຟຽພັດ

ແຂ້ວ, ມິດແກໝວດ, ຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວອື່ນໆ ເຊິ່ງອາດຈະມີເລືອດຕິດຢູ່ນຳເຄື່ອງນັ້ນໆ

- ຫໍຮຽປາດ ແລະ ບາດແພ ຂອງທ່ານໄວ້
- ກ້າງທ່ານມີຄູ່ຮ່ວມເພດຜູ້ດຽວເປັນເວລາດົນນານ, ໂອກາດທີ່ຈະແພ່ເຊື້ອໄວຣັສຕັບ C ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງທ່ານກໍມີໜ້ຽແລະທ່ານກໍບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະປຽນແປງການມີເພດສຳພັນຂອງທ່ານ. ກ້າງທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດທີ່ຈະແພ່ເຊື້ອໄວຣັສຕັບ C ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງ ທ່ານ,

ທ່ານອາດຈະໃຊ້ວິທີການນຳໃຊ້ກິງຢາງອະນາມັຍ (latex condoms). ພົມປະໂຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການນຳໃຊ້ ກິງຢາງອະນາມັຍເພື່ອປ້ອງກັນການແພ່ເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ C ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ໄດ້ເທື່ອ, ແຕ່ກ້າວ່າ ທ່ານ ຫາກນຳໃຊ້ກິງຢາງອະນາມັຍແບບບຸກິກວິທີກໍອາດສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນ ໂອກາດທີ່ຈະແພ່ເຊື້ອໄດ້. ການທ່ານໝໍຂອງທ່ານເລື່ອງທີ່ວ່າຄວນກວດເລືອດ ຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງທ່ານນຳຫຼືບໍ່.

ກ້າວ່າຂໍຮຽພວມກິພາຢູ່ຄວນຈະເຮັດແນວໃດ?

What if I am pregnant? ມີເດັກນ້ຽເກີດໃໝ່ ຈຳນວນ 5 ຕໍ່ 100 ຄົນທີ່ເກີດຈາກແມ່ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ C ນັ້ນ ຈະມີອາການ ຕິດເຊື້ອເຊັ່ນກັນ. ອາການຕິດເຊື້ອຈະມີມາແຕ່ເກີດ, ແລະຈະບໍ່ມີການປິ່ນປົວອັນໃດເພື່ອຊ່ອຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກມີ ອາການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີຍ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ເດັກນ້ຽທີ່ມີອາການຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບ C ມາແຕ່ເກີດ ກໍຍັງຈະມີອາການ ທີ່ປົກກະຕິດີໄປ ໄດ້ຫຼາຍປີ. ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າເດັກນ້ຽເລົ່ານັ້ນຈະມີບັນຫາຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບ C ຫຼືບໍ່ ເມື່ອເວລາພວກເຂົາ ໃຫ້ຮຽ ຂຶ້ນມາ ເພິ່ນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາວິ. ຈຕີມອີກຢູ່. ບໍ່ຄວນຍົກເວັ້ນຫຼືສັ່ງຫ້າມບຸກຄົນທີ່ມີເຊື້ອໄວ

ຣັສຕັບ C ຈາກການເຂົ້າເຮັດການ, ໂຮງຮຽນ, ການເຫຼິ້ນມ່ວນຊື່ນຫຼືກິລາ, ບ່ອນລ້ຽງເດັກນ້ຽ ຫຼື ກິດຈະກຳອື່ນໆ ພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ C ຈະບໍ່ແພ່ເຊື້ອດວຍວິທີ : (Hepatitis C is NOT spread by:)

- ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ
- ຈາມ (sneezing)
- ການກອດຮັກແພຄກັນ (hugging)
- ໃອ (coughing)
- ໃຊ້ຈອກນ້ຳ ຫຼື ກູ້ວຍບ່ວງ ຮ່ວມກັນ
- ກິນອາຫານຫຼືນ້ຳຮ່ວມກັນ
- ຈັບບາຍກັນ

ກ້າວ່າທ່ານຕິດຢາ ຫຼືສັກຢາເສບຕິດ: (If you use or inject street drugs)

- ຢູ່ດາງໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັບໝູ່ແລະໄປຮັບການບິນໄວນຳຫ້ອງການແພງງານຕັ້ງຢາເສບຕິດ
- ກ້າວ່າ ທ່ານຢຸດຢາເສບຕິດບໍ່ໄດ້, ກໍບໍ່ຄວນໃຊ້ເຂັມເກົ່າຊ້າຫຼາຍເທື່ອຫຼືໃຊ້ເຂັມສັກຮ່ວມກັບໝູ່
- ສັກຢາວັກຊິນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ A ແລະ ຕັບອັກເສບໄວຣັສ B

ກ້າທ່ານຢູ່ໃນວັຍທີ່ມີເພດສຳພັນ, ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຜູ້ດຽວແບບກ່າວອນ:

If you are having sex, but not with one steady partner:

- ທ່ານແລະຄູ່ນອນຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດເຊື້ອ ຈາກການຮ່ວມເພດ (ເຊັ່ນ: ໂຣຄເອັດສ*, ພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ B, ໂຣກໝອງໃນທີ່ອະວັຍວະເພດຫຼື gonorrhoea or chlamydia), ທ່ານ ຈຶ່ງຄວນ ນຳໃຊ້ກິງຢາງອະນາມັຍ ຫຼື latex condoms ທາງເທື່ອທີ່ມີການຮ່ວມເພດ ແລະຄວນ ນຳໃຊ້ແບບບຸກິກວິທີ (ພົມປະໂຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການນຳໃຊ້ກິງຢາງອະນາມັຍເພື່ອປ້ອງກັນການແພ່ເຊື້ອໄວ ຣັສຕັບ C ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ເທື່ອ, ແຕ່ກ້າວ່າທ່ານຫາກນຳໃຊ້ກິງຢາງອະນາມັຍ

ແບບກຸກວິທີກໍອາດ ສາ ມາດຫຼຸດຜ່ອນໄອ
 ກາດທີ່ຈະແຜ່ເຊື້ອໄດ້). ວິທີທີ່ແນ່ນອນທີ່ສຸດສໍາລັບ
 ປ້ອງກັນ ການຕິດແປດ ຫຼືແຜ່ເຊື້ອ ພະຍາດ
 ທີ່ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ທາງເພດສໍາພັນແມ່ນດ້ວຍວິທີ
 ບໍ່ມີການຮ່ວມເພດເລີຍ.

●ຄວນສັກຢາວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກ
 ເສບໄວຣັສ B ບໍ່ມີຢາວັກຊີນ ສໍາລັບປ້ອງ
 ກັນພະຍາດຕັບອັກເສບໄວຣັສ ຊີ
 ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ C
 ແລ້ວກໍຍັງສາມາດຕິດເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບອື່ນໆ
 ໄດ້ອີກເຊັ່ນກັນເປັນຕົ້ນວ່າໄວຣັສຕັບອັກເສບ
 A ແລະ ໄວຣັສຕັບອັກເສບ B

Dr. Jon Sivoravong
 Assistant Professor
 University of North Texas
 Health Science Center
 Department of Family Medicine



19th-Century Laotian Women